

# *Pagdudugo Ng Sugat Nakakatakot Nabulunan*

*Book 11*



MATI BAPTIST HOSPITAL  
CHILD CARE HEALTH CARE AND NUTRITION GARDENING PHARMACY SWITZER  
**CHANGES**  
*Alang sa Maayong Panglausas ug Kinabuhì*

## Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa panginoong Hesukristo.

Translation needed



### ANG KALUWASAN TUNGOD SA PAGTOO SA GINOONG JESUS

**G**IPANGHIMO NI JESUS ang daghan pang ubang mga milagro nga wala mahisulat niining basahona : apan kining ania gisulat aron motoo kamo nga si Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios, ug nga sa pagtoo makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan.

Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag gahum sa pagkahimong mga anak sa Dios.

### UMARI KANAKO!

Ang Ginoong Jesus miingon :

Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtoon kamo gikan kanako ; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasingsing, ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan.

Siya nga moari kanako dili ko gayud igasalikway.

Umanhi ka ug sumonod ka kanako.

Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok ; kon may magapatalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako, ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban kanako.

## ***Kailan dapat dinadala ang pasyente sa ospital.***

1. Kung ang sugat ay patuloy na dumudugo.
2. Kung ang pasyente ay napagod at nanghihina dahil sa naubusan na ng dugo.
3. Ang taong nawalan ng malay pero hindi naman naaksidente.
4. Ang naaksidente na nawalan ng malay sa loob ng 1 oras.

## ***Pagdudugo ng sugat***

Ang patuloy na pagdudugo ay nakakatakot.

Ang pasyente ay maaaring mawalan ng malay o matakot.

Namumutla na parang patay.

Patigilin sandali ang pagdudugo.

Kung magigising at makakainom na ang pasyente, bigyan agad ng maraming tubig.

Huwag bigyan ng tubig ang nawalan ng malay (hinimatay)

## ***Kung ang nabulunan ay may edad na***


Kung ang pagkain o bagay ang nakabara sa lalamunan at hindi makahinga, gawin agad ang mga sumusunod:

Tumayo sa likod ng tao at ilagay ang 2 kamay sa bewang.

Ilagay ang 2 kamao sa sikhura, sa itaas ng pusod, o sa ibaba ng “ribs”

Idiin bigla ang kamao pataas.

Ipagpatuloy kung kinakailangan. Ang pagdiin ay magdadala ng hangin mula sa baga at matatanggal ang nakabara sa lalamunan.





## ***Pagpatigil sa pagdudugo***

Diinan ng malakas o madlin ang sugat ng malinis na tela. Huwag tigilan kahit na mapagod. Huwag tanggal-tanggalin ang tela para magsara ang sugat.

Ang pagpatigil sa pagdudugo ay minsan umaabot ng 15 minuto, minsan ay aabot ng 1 oras o mahigit.

Kung walang malinis na tela, gamitin ang kamay sa pagpapatigil. Ang mahalaga ay tumigil agad ang pagdudugo.

Huwag maglagay ng kahit na anumang bagay sa sugat para hindi ito maimpeksyon.

## ***Ang batang nabulunan***

Minsan ay nababara ang lalamunan at bunganga pag kumain.


Inuuboa ang katawan ay nangingitim. Alisin agad ang nakabara at ng hindi maaksidente.

Ang dapat gawin:

Ituwad ang bata at paluin ang likod nito, hanggang iuubo nya ang nakakabara.

Kung hindi lalabas kuhitin o kaya ay dukutin ang bara.

Kung wala pa ring mangyari at namumutla na, dalhin agad sa doktor.





## ***Hinimatay***

Kapag ang tao ay nauubusan ng dugo, maaring merong maramdaman tulad ng panghihina, naguguluhan, nawawalan ng ulirat, namumutla at nanglalamig ang pawis.

Mga dapat gawin:

Pahigain ang pasyente.


Ipataas ang paa

Kumutan ang pasyente mula leeg hanggang sa paa.

Kapag gising painumin ng mainit na tubig o tsaa.

Kausapin ang pasyente ng dahan-dahan o kalmado.

Plakasin ang pasyente.



## ***Pag-asikaso sa hinimatay***

Asikasuhing mabuti ang taong hinimatay. Alamin at tiyakin kung ang pasyente ay humihinga pa.

Pahiga-in na nakatagilid, at ang ulo ay ibaba ng konti.

Kung susuka, linisin ang bibig at tiyakin na ang ulo at balik at ay nakatagilid din ang posesyon.

Huwag painumin hanggang magising.